Leukosan® Adhesive

Colle cutanée stérile ultra haute viscosité

DESCRIPTION :

Leukosan® Adhesive est une colle cutanée stérile ultra haute viscosité pour la fermeture cutanée de plaies ou d'incisions. Sous l'effet de l'humidité existante de la peau, la colle se polymérise et forme en quelques secondes une pellicule souple qui protège la plaie et rapproche ses berges en toute sécurité.

CARACTERISTIQUES:

- Ultra haute viscosité
- Facile à utiliser et économique,
- Polymérisation rapide,
- Application et retrait indolores,
- Film flexible et conformable
- Résistant à l'eau
- Anesthésie locale non nécessaire
- Stérile
- Barrière microbienne
- Stockage à température ambiante (inférieure à 30°C)



INDICATIONS:

Leukosan® Adhesive est indiquée pour la fermeture cutanée de coupures ou de lacérations, ainsi que pour celle de petites incisions ou ponctions chirurgicales dont les berges peuvent être facilement rapprochées. Elle est uniquement conçue pour une application cutanée.

MODE D'EMPLOI:

Leukosan® Adhesive est une colle ultra haute viscosité. Cependant, pour éviter une fuite accidentelle vers des zones inopportunes, la plaie doit être positionnée dans le plan horizontal et la colle doit être appliquée uniformément en surplombant la plaie. Les propriétés de fermeture de plaie de Leukosan® Adhesive sont totalement obtenues après la polymérisation complète de la première couche, ce qui dépend du type de peau, de l'hydratation cutanée et de l'hygrométrie ambiante. Si une seconde couche est appliquée, le temps de polymérisation est prolongé d'autant.

1.S'assurer de l'hémostase de la plaie.
2.Nettoyer la plaie. Bien la rincer au sérum physiologique pour enlever toutes traces d'huile ou de solvant ainsi que le film gras que pourraient laisser certains antiseptiques (ex. Betadine®).
3.Bien sécher la plaie et son pourtour.
4.Ouvrir le sachet stérile et sortir le tube et les deux applicateurs.
5.Choisir l'applicateur adapté à la plaie : la pointe fine permet une fermeture précise et un contrôle maximal ; l'embout mousse permet d'obtenir une application plus large. Vous pouvez également utiliser les deux applicateurs successivement pour réaliser un film protecteur.
6.Tenir le tube par sa base, l'ouverture orientée vers le haut, puis visser l'applicateur choisi sans presser le tube. Le sceau métallique est alors perforé, et la colle cutanée peut être appliquée en pressant légèrement sur le tube. La colle cutanée de couleur violet pâle doit être utilisée rapidement dès qu'elle est visible dans l'applicateur (tube ouvert pendant 30 minutes maximum).
7.Utiliser vos doigts gantés ou des pinces afin de rapprocher soigneusement les berges de la plaie.
8.Appliquez une fine couche de Leukosan® Adhesive sur les berges de la plaie d'un mouvement uniforme. Une seule couche est suffisante pour une fermeture sûre et permanente de la plaie. L'application d'une quantité excessive de colle peut ralentir la formation de la pellicule.
9.Maintenir les berges de la plaie rapprochées pendant au moins 25 secondes. La vitesse de polymérisation dépend de l'humidité de l'air et de la peau. Elle ne doit pas prendre plus de 60 secondes.
10.Après la polymérisation de la première couche, vous pouvez appliquer une seconde couche plus large, au moyen de l'embout mousse, afin de créer un film protecteur antimicrobien.
11.La colle cutanée forme une pellicule sûre et protectrice quand elle n'adhère plus aux doigts. Vous pouvez appliquer un pansement supplémentaire en veillant à ce qu'il n'adhère ni à la plaie, ni à la pellicule de colle.

Attention :
- temps de prise : environ 25 à 40 secondes.
- temps de polymérisation totale : environ 60 secondes

Tube de 0,7 ml pouvant couvrir des plaies jusqu'à 20 cm.

PARTICULARITES D' UTILISATION:

- La colle Leukosan® Adhesive est conditionnée pour un usage unique et individuel sur un patient.
- Ne pas réutiliser ou restériliser. La réutilisation de la colle cutanée expose les patients à un risque de transmission de contaminants par des liquides corporels et des tissus provenant de patients précédents et pouvant contenir des agents pathogènes.

- Leukosan® Adhesive doit être utilisée dans les minutes qui suivent l'ouverture du tube, car le produit commence à se polymériser au contact de l'humidité de l'air.
- Le matériel restant doit être éliminé après chaque fermeture d'une plaie.
- Si deux zones de peau intactes sont collées involontairement, décoller délicatement au moyen de vaseline, d'une pommade, d'acétone. Ne pas tenter de séparer par traction les zones cutanées collées.
- En cas d'utilisation du produit à proximité des yeux, appliquer de la vaseline afin de former une barrière protectrice et protéger les yeux au moyen d'une compresse et positionner le patient de telle façon que la colle cutanée ne puisse s'écouler vers les yeux.
- En cas de contact accidentel de la colle avec un oeil, appliquer une pommade ophtalmique. Si les paupières sont collées, ne pas tenter de les ouvrir par traction, mais dissoudre la colle au moyen d'eau chaude et d'une lotion et appliquer un pansement oculaire jusqu'au moment où l'adhésion aura diminué.
- Afin de préserver les propriétés adhésives de Leukosan® Adhesive, ne pas appliquer de lotion, pommade ou solution médicamenteuse sur le film adhésif ou autour de celui-ci car ces substances peuvent affaiblir la pellicule adhésive.
- Eviter tout contact de la colle cutanée avec des gants, des instruments et des dispositifs, et tout particulièrement avec des surfaces ne pouvant être nettoyées au moyen d'acétone, car le cyanoacrylate pourrait les endommager de façon irréversible

PRECAUTIONS D' EMPLOI:

- Une fois la plaie fermée par Leukosan® Adhesive, apparaît une pellicule adhésive à peine visible à la surface de la peau. Cette pellicule maintient la plaie fermée en toute sécurité jusqu'à ce que la résistance de la cicatrice soit suffisante. La pellicule s'élimine lentement par fragments tandis que la plaie cicatrise, puis disparaît au bout de cinq à dix jours, quand la couche cutanée la plus superficielle s'est renouvelée.
- La pellicule est imperméable à l'eau. Une plaie fermée au moyen de Leukosan® Adhesive, au cours de la phase de cicatrisation, peut être exposée à l'eau mais pas de façon prolongée, par exemple lors d'une douche.
- Après contact avec l'eau la zone de la plaie doit être séchée en la tapotant délicatement.
- Ne pas appliquer de lotion, de pommade ou d'autres liquides sur la pellicule adhésive ou autour de celle-ci. Ne jamais frotter ou gratter la pellicule adhésive ou tirer sur celle-ci. Chez un enfant, il peut être nécessaire d'appliquer un pansement protecteur.
- Si la pellicule adhésive se détache prématurément avant la cicatrisation totale de la plaie ou si la plaie s'ouvre ou s'infecte, appelez immédiatement votre médecin.
- Leukosan® Adhesive ne doit pas entrer en contact avec les yeux, les muqueuses ou une plaie ouverte infectée
- Leukosan ® Adhesive ne doit pas être appliquée sur une surface cutanée où la tension est élevée, sauf si cette tension a été réduite par des sutures intradermiques ou sous-cutanées
- Les plaies situées sur une surface exposée à l'humidité ou aux frictions ne doivent pas être fermées au moyen de cette colle
- Toujours se référer à la notice d'utilisation et respecter les précautions d'emploi
- Ne pas utiliser si le sachet est ouvert ou endommagé.
- Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
- Ne pas presser le tube avant de l'ouvrir, et, s'il est déformé, prendre des précautions particulières afin d'éviter que son contenu ne se répande à l'ouverture.
- Eviter toute pénétration de la colle cutanée dans la plaie, car cela pourrait provoquer une réaction à un corps étranger ou entraîner un mauvais résultat esthétique. Utiliser un linge sec (compresse) afin d'éliminer la colle

cutanée en excès.

ENTRETIEN :

Se reporter aux précautions d'emploi

CONTRE-INDICATIONS:

- En cas d'adhésivité impossible ou insuffisante : peau mouillée, présence d'exsudats, de sébum ou de mucus, de lotion ou de pommade à base d'huile, zone pileuse ou autre zone qui altère ou ne permet pas la fermeture de la plaie au moyen d'une colle cutanée,
- Plaie ouverte infectée,
- Plaies comportant des berges déchiquetées,
- Plaies consécutives à des morsures,
- Plaie de décubitus,
- Plaie exposée aux frictions
- Excisions cutanées étendues
- Plaies exposées à l'humidité,
- Plaies avec perte de substances,
- Plaie avec forte tension, sauf si cette tension a été réduite par des sutures intradermiques ou sous-cutanées,
- Allergie connue à l'un des composants

CONDITIONNEMENT:

Tube de 0,7 ml livré avec deux applicateurs (embout fin + mousse).

Livré par boite de 10 sachets comprenant eux mêmes 1 tube de 0,7 ml avec deux embouts applicateurs (1 embout fin et 1 embout mousse plus large).

Minimum de commande : 1 boite de 10 sachets

EAN13	*ACL7*	Référence (*)	*Dimensions*	*Unité de cde*	*Carton stand.*	*Code LPPR*
4042809226782	*2087815*	72541-00000-00	1Tube 0,7ml+2 embouts	1 bte de 10	8 boites	

(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

STERILISATION:

Oxyde Ethylène

BSN medical SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282

- **Système de Management certifié**
- **EN ISO 9001**
- **EN ISO 13485**